

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Bon Bild-Seite | Total 596 Arten | Speise-wert Giftig-keit | Monat | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | Lateinische Namen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pilzarten | | 272 | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | | |
| Röhrling, Hasen- | Gyroporus castaneus | 32 | 1 | * | | | | | | | 1 | | | | | |
| Steinpilz - Fichten | Boletus edulis | 35 | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Steinpilz - Sommer | Boletus aestivalis | 35 | 6 | *** | | | | | 4 | 1 | | | | 1 | | |
| Röhrling, Bitter-, wurzelnder | Boletus radicans | 36 | 2 | * | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Röhrling, Anhängsel- | Boletus appendiculatus | 37 | 2 | * | | | | | 2 | | | | | | | |
| Röhrling, Schönfuss- | Boletus calopus | 37 | 6 | *** | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| Röhrling, Hexen-, glattstieliger | Boletus queletii | 39 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Hexen-, flockenstieliger | Boletus erythropus | 39 | 13 | *** | | | | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | |
| Röhrling, Hexen-, netzstieliger | Boletus luridus | 39 | 5 | * | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | |
| Röhrling, Rosahütiger | Boletus legaliae | 39 | 2 | * | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| Röhrling, Satans- | Boletus satanas | 39 | 1 | *** | | | | | | | 1 | | | | | |
| Rauhfuß, Birken- (Birkenpilz) | Leccinum scabrum | 41 | 4 | ** | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| Rauhfuß, Hainbuchen- | Leccinum carpini | 41 | 3 | * | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Rauhfuß, Pappel- | Krombholtiella duriuscula | 41 | | ** | | | | | | | | | | | | |
| Rotkappe, Birken- | Leccinum versipelle | 41 | | ** | | | | | | | | | | | | |
| Rotkappe, Espen- | Leccinum aurantiacum | 41 | 1 | ** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Röhrling, Rotfuß- | Xerocomus chrysenteron | 43 | 4 | * | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Ziegenlippe | Xerocomus subtomentosus | 43 | 3 | * | | | | | 1 | | 2 | | | | | |
| Goldblatt | Phylloporus pelletieri | 45 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Maronen- | Xerocomus badius | 45 | 6 | ** | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| Röhrling, Pfeffer- | Chalciporus piperatus | 45 | 3 | * | | | | | | | | 2 | 1 | | | |
| Röhrling, Ochsen- | Boletus torosus | 46 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Butterpilz, Ringloser | Suillus collinitus | 47 | | ** | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Gold- | Suillus grevillei | 47 | 2 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Röhrling, Körnchen- | Suillus granulatus | 47 | 2 | * | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Röhrling, Düsterer (Porphy.) | Porphyrellus porphyrosporus | 49 | 1 | * | | | | | | | 1 | | | | | |
| Röhrling, Gallen- | Tylopilus felleus | 49 | 2 | * | | | | | | 2 | | | | | | |
| Röhrling, Kuh- | Suillus bovinus | 49 | 3 | * | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Röhrling, Strubbelkopf-, Gemeiner | Strobilomyces strobilaceus | 49 | 2 | * | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| Gelbfuss, Kupferroter | Chroogomphus rutilus | 51 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | |
| Krempling, Kahler | Paxillus involutus | 51 | 4 | *** | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| Krempling, Muschel-, Gemeiner | Paxillus panuoides | 51 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Krempling, Samtfuss | Paxillus atrotomentosus | 51 | 2 | * | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Kuhmaul | Gomphidius glutinosus | 51 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Pfifferling, Falscher | Hygrophoropsis aurantiaca | 51 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Schwärz-, Dichtblättriger | Russula densifolia | 55 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Schwärz-, Dickblättriger | Russula nigricans | 55 | 4 | * | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| Täubling, Schwärz-, Menthol | Russula albonigra | 55 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Weiss-, Breitblättriger | Russula delica | 55 | 2 | * | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Täubling, Weiss-, Schmalblättriger | Russula chloroides | 55 | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Täubling, Frauen- | Russula cyanoxantha | 57 | 8 | ** | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild-Seite | Total 596 Arten | Speise-wert Giftig-keit | Monat | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | | |
| Täubling, Frauen-, hartfleischiger | Russula langei | 57 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Grünfeldriger | Russula postiana | 57 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Speise-, Fleischroter | Russula vesca | 57 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Täubling, Speise-, Grüner | Russula heterophylla | 57 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Täubling, Wiesel- | Russula mustelina | 57 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Birken-, Grasgrüner | Russula aeruginea | 59 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Grauvioletter | Russula grisea | 59 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Violettstieliger | Russula violeipes | 59 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Jodoform | Russula turci | 61 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Täubling, Zinnober-, Harter | Russula lepida (rosacea / rosea) | 61 | 5 | * | | | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | |
| Täubling, Vielfarbiger | Russula versicolor | 63 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Wachs-, Milder | Russula puellaris | 63 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Herings-, Nadelwald- | Russula xerampelina f. fuscoochracea | 65 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Buckel- | Russula caerulea | 67 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Leder-, Brauner | Russula integra | 67 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Leder-, Glänzender | Russula alutacea | 67 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Leder-, Rotstieliger | Russula olivacea | 67 | 5 | * | | | | | | | | 3 | 2 | | | | |
| Täubling, Leder-, Weissstieliger | Russula romellii | 67 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Gold- | Russula aurea | 69 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Täubling, Spei-, Buchen- | Russula mairei | 71 | 1 | ** | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Espen- | Russula pelargonica | 73 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Hohlstieliger | Russula cavipes | 73 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Täubling, Stachelbeer- | Russula queletii | 75 | 5 | * | | | | | | | | 2 | 3 | | | | |
| Täubling, Zedernholz- | Russula badia | 77 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Zinnober-, Scharfer | Russula rubra | 77 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Gallen- | Russula fellea | 79 | | *** | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Mandel- | Russula grata | 79 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Täubling, Mehlstiel- | Russula farinipes | 79 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Ockerweisser (Ocker-) | Russula ochroleuca | 79 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Täubling, Stink- | Russula foetens | 79 | 2 | * | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| Reizker, Edel- | Lactarius deliciosus | 81 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Reizker, Fichten- | Lactarius deterrimus | 81 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Reizker, Kiefern-, Spangrüner | Lactarius semisanguifluens | 81 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Reizker, Lachs- | Lactarius salmonicolor | 81 | 6 | * | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | | | |
| Milchling, Grubiger | Lactarius scrobiculatus | 83 | 3 | * | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Reizker, Birken | Lactarius torminosus | 83 | | ** | | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Fleischblasser | Lactarius pallidus | 85 | 4 | ** | | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| Milchling, Hainbuchen-, Gebändeter | Lactarius circellatus | 85 | 1 | * | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Milchling, Hasel-, Scharfer | Lactarius pyrogalus | 85 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Blassrandiger | Lactarius fluens | 87 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Graugrüner | Lactarius blennius | 87 | 2 | * | | | | | | | | | | 2 | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Bon Bild- Seite | Total 596 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | Lateinische Namen | | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Total Pilzarten | | 272 | | | | | | 32 | 63 | 31 | 89 | 106 | 115 | | |
| Milchling, Olivbrauner | Lactarius turpis | 87 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | |
| Maggipilz (Bruchreizker) | Lactarius helvus Fr. | 89 | | *** | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Rotbrauner | Lactarius rufus | 89 | | * | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Eichen-Brätling | Lactarius quietus | 91 | 2 | * | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | Lactarius volemus | 95 | 2 | * | | | | | | | 2 | | | | |
| Milchling, Pfeffer-, Grünender | Lactarius glaucescens | 95 | | * | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Pfeffer-, Langstieliger | Lactarius piperatus | 95 | 2 | * | | | | | | 2 | | | | | |
| Milchling, Wolliger | Lactarius vellereus | 95 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | |
| Milchling, Flügelsporiger | Lactarius pterosporus | 97 | | * | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Mohrenkopf- | Lactarius lignyotus | 97 | 1 | * | | | | | | | 1 | | | | |
| Milchling, Pechschwarzer | Lactarius picinius | 97 | 1 | * | | | | | | | 1 | | | | |
| Milchling, Rosaverfärbender | Lactarius acris | 97 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | |
| Milchling, Kampfer- | Lactarius camphoratus | 99 | | * | | | | | | | | | | | |
| Saftling, Schwärzender | Hygrocybe pseudoconica | 105 | 1 | ** | | | | | 1 | | | | | | |
| Schneckling, Elfenbein- | Hygrophorus eburneus | 115 | 5 | * | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| Schneckling, Goldzahn- | Hygrophorus chrysodon | 115 | 2 | * | | | | | | | | | 2 | | |
| Schneckling, Starkriechender | Hygrophorus discoxanthus | 115 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | |
| Schneckling, Terpentin- | Hygrophorus pudorinus | 115 | 4 | * | | | | | | | | | 4 | | |
| Schneckling, Purpur-, Geflecktblätt. | Hygrophorus russula | 117 | | * | | | | | | | | | | | |
| Seitling, Muschel-, Gelbstieliger | Panellus serotinus | 120 | | * | | | | | | | | | | | |
| Seitling, Berindeter | Pleurotus dryinus | 121 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | |
| Seitling, Cremeweisser | Pleurotus pulmonarius | 121 | | * | | | | | | | | | | | |
| Seitling, Orange- | Pleurotus nidulans | 121 | | * | | | | | | | | | | | |
| Knäueling, Glatter | Lentinus torulosus | 123 | 3 | * | | | | | 2 | 1 | | | | | |
| Sägeblättling, Schuppiger | Lentinus lepideus | 123 | 2 | * | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Zähling, Anis- | Lentinellus cochleatus | 125 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | |
| Nabeling, Glöckchen-, Geselliger | Xeromphalina campanella | 128 | | * | | | | | | | | | | | |
| Nabeling, Heftel-, Orangegelber | Rickenella fibula | 129 | | * | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Gabel-, Kaffeebrauner | Pseudoclitocybe cyathiformis | 131 | 2 | * | | | | | | | | | 2 | | |
| Trichterling, Kerbrandiger | Clitocybe costata | 135 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | |
| Trichterling, Keulenus- | Clitocybe clavipes | 135 | | ** | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Kohlen- | Clitocybe sinopica | 135 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | |
| Trichterling, Mönchskopf- | Clitocybe geotropa | 135 | 3 | ** | | | | | | | | | 3 | | |
| Trichterling, Ockerbrauner | Clitocybe gibba | 135 | 2 | * | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Trichterling, Anis-, Grüner | Clitocybe odora | 137 | 2 | * | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Trichterling, Firmis-, Bleiweisser | Clitocybe phylliphila | 137 | 2 | ** | | | | | | | | | 2 | | |
| Trichterling, Gift-, Rinnigbereifter | Clitocybe rivulosa | 137 | | ** | | | | | | | | | | | |
| Trichterling, Nebelgrauer (Nebelkappe) | Clitocybe nebularis | 137 | 5 | * | | | | | | | | 1 | 4 | | |
| Hallimasch, Gewöhnlicher | Armillaria ostoyae | 143 | 4 | * | | | | | | | | 1 | 3 | | |
| Ritterling, Rötel-, Fuchsiger | Lepista inversa | 143 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Rötel-, Blassblauer | Lepista glaucocana | 145 | 2 | * | | | | | | | | | 2 | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild- Seite | Total 596 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | | 32 | 63 | 31 | 89 | 106 | 115 | | | |
| Ritterling, Rötel-, Lilastiel- | Lepista saeva | 145 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Rötel-, Violetter | Lepista nuda | 145 | 2 | ** | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Ritterling, Veilchen- | Lepista irina | 145 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Lacktrichterling, Rötlicher | Laccaria amethystina | 147 | 2 | * | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Lacktrichterling, Violetter | Laccaria laccata | 147 | 4 | * | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| Ritterling, Holz-, Olivgelber | Tricholomopsis decora | 151 | 3 | * | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| Ritterling, Holz-, Purpurfilziger | Tricholomopsis rutilans | 151 | 5 | * | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | |
| Ritterling, Seifen- | Tricholoma saponaceum | 151 | 2 | *** | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Ritterling, Brennender | Tricholoma virgatum | 153 | 3 | * | | | | | | | | | 2 | 1 | | | |
| Ritterling, Lästiger | Tricholoma inamoenum | 153 | 1 | ** | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Ritterling, Schwefel- | Tricholoma sulphureum | 153 | 1 | *** | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Tiger- | Tricholoma pardalotum | 153 | 2 | ** | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Ritterling, Erd-, Beringter | Tricholoma cingulatum | 155 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Erd-, Gemeiner | Tricholoma terreum | 155 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Gilbender | Tricholoma sculpturatum | 155 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Mausgrauer | Tricholoma myomyces | 155 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Rötender | Tricholoma orirubens | 155 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Erd-, Schuppenstieliger | Tricholoma squarrulosum | 155 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Rötender | Tricholoma orirubens var. Basirubens | 155 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Ritterling, Schwarzschuppiger | Tricholoma atrosquamosum | 155 | 5 | * | | | | | | | | | 1 | 4 | | | |
| Ritterling, Seidiger | Tricholoma columbetta | 157 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Ritterling, Brandiger | Tricholoma ustale | 158 | 1 | *** | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Bärtiger | Tricholoma vaccinum | 159 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Ritterling, Gelbblättriger | Tricholoma fulvum | 159 | 2 | *** | | | | | | | | | 2 | | | | |
| Ritterling, Gerippter | Tricholoma acerbum | 159 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Ritterling, Eichen-, Bitterer | Tricholoma ustaloides | 161 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Krempentrichterling, Riesen- | Leucopaxillus giganteus | 163 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Weich-, Rauhfuss- | Melanoleuca verrucipes | 165 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Weichritterling, Rauhfuss- | Melanoleuca verrucipes | 165 | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Rasling, Büschel-, Ockerbrauner | Lyophyllum decastes | 167 | 2 | * | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Rasling, Büschel-, Weisser | Lyophyllum connatum | 167 | | ** | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Mai- | Calocybe gambosa | 167 | 4 | * | | | | | 3 | 1 | | | | | | | |
| Schönkopf, Dottergelber | Calocybe chrysenteron | 167 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Zwitterling, Beschleierter | Nyctalis parasitica | 169 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Rübling, Samt-, Bitterer | Oudemansiella longipes | 171 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Schleim-, Wurzelnder | Oudemansiella radicata | 171 | 6 | * | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| Schirmling, Körnchen-, Amiant | Cystoderma amiantinum | 173 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Glimmer-, Goldfarbener | Phaeolepiota aurea | 173 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schwindling, Halsband | Marasmiellus rotula | 175 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Schwindling, Hornstieliger | Marasmius cohaerens | 175 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Schwindling, Knoblauch-, Saitenstiel. | Marasmius alliaceus | 175 | | * | | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild-Seite | Total 596 Arten | Speise-wert Giftig-keit | Monat | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | | | 32 | 63 | 31 | 89 | 106 | 115 | | |
| Schwindling, Nelken- | Marasmius oreades | 175 | 1 | * | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Schwindling, Violettlicher | Marasmius wynnei | 175 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Schwindling, Stink-, Gemeiner | Micromphale foetidum | 176 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Breitblättriger | Megacollybia platyphylla | 177 | 9 | * | | | | 1 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Schwindling, Ästchenzweig- | Marasmiellus ramealis | 177 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Butter- | Rhodocollybia butyracea | 179 | 2 | * | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Rübling, Brennender | Collybia peronata | 179 | 3 | * | | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| Rübling, Büschel-, Knopfstieliger | Collybia confluens | 179 | 5 | * | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | |
| Rübling, Gefleckter | Collybia maculata | 179 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Rübling, Spindeliger | Collybia fusipes | 179 | 3 | * | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| Rübling, Waldfreund- | Collybia dryophila | 179 | 7 | * | | | | 3 | 3 | | | 1 | | | | | |
| Helmling, Rettich- | Mycena pura | 181 | 3 | *** | | | | | | | | | | | 3 | | |
| Helmling, Rettich-, Rosa | Mycena rosea | 181 | 2 | *** | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Helmling, Dehnbarer | Mycena epipterygia | 183 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Weissgelber | Mycena flavoalba | 183 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Rillstieliger | Mycena polygramma | 185 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Mehlräsling | Clitopilus prunulus | 189 | 6 | * | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | |
| Tellerling, Fleischroter | Rhodocybe truncata | 189 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Rötling, Kreuzsporiger | Entoloma rickenii | 191 | | *** | | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, alkalischer | Entoloma nidorosum | 193 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, Riesen- | Entoloma sinuatum | 193 | 5 | *** | | | | | | | | 3 | 2 | | | | |
| Rötling, Weissstieliger | Entoloma lividoalbum | 193 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Dachpilz, Graugrüner | Pluteus salicinus | 197 | | *** | | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Löwengelber | Pluteus leoninus | 197 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Rehbrauner | Pluteus cervinus | 197 | 2 | * | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Dachpilz, Schwarzflockiger | Pluteus umbrosus+B338 | 197 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Flockenstieliger | Pluteus podospileus | 199 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Dachpilz, Gelbstieliger | Pluteus romellii | 199 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Grauer | Pluteus cinereofuscus | 199 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Dachpilz, Rosastieliger | Pluteus roseipes | 199 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Scheidling, Grosser | Volvariella speciosa | 199 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Schleimfuss, Blauer | Cortinarius salor | 203 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schleimfuss, Natternstieliger | Cortinarius trivialis | 203 | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schleimkopf, Bitterer | Cortinarius infractus | 205 | 2 | * | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Schleiereule | Cortinarius praestans | 209 | 3 | ** | | | | | | | | | 2 | 1 | | | |
| Schleimkopf, Blasser | Cortinarius largus | 209 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Schleimkopf, Erdgriechender | Cortinarius variegatus | 209 | 4 | * | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| Klumpfuss, Schwarzgrüner | Cortinarius atrovirens | 211 | 1 | *** | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Klumpfuss, Reihen-, Blasser | Cortinarius glaucopus | 215 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Buchen- | Cortinarius anserinus | 215 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Purpurfleckiger | Cortinarius purpurascens Fr. | 215 | | * | | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild-Seite | Total 596 Arten | Speise-wert Giftigkeit | Monat | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | | |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | | 32 | 63 | 31 | 89 | 106 | 115 | | | | |
| Klumpfuss, Reihen-, Olivfarbener | Cortinarius glaucopus | 215 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Violetter | Cortinarius sodagnitus | 215 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Rauhkopf, Grüner | Cortinarius venetus | 223 | 2 | ** | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Rauhkopf, Orangefuchsiger | Cortinarius orellanus | 225 | 1 | *** | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Rauhkopf, Rotschuppiger | Cortinarius bolaris | 225 | 1 | *** | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Hautkopf, Blutblättriger | Cortinarius sanguineus | 226 | 1 | *** | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Hautkopf, Blutroter | Cortinarius semisanguineus | 226 | 2 | *** | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Hautkopf, Orangefaseriger | Cortinarius malicorius | 227 | | *** | | | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Rettich- | Hebeloma sinapizans | 229 | 1 | ** | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Fälbling, Tonblasser | Hebeloma crustuliniforme | 229 | | ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Dunkelscheibiger | Hebeloma mesophaeum | 231 | 1 | * | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Marzipan-, Wurzelnder | Hebeloma radicosum | 231 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Fälbling, Wurzel- | Hebeloma radicatum | 231 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Zigeuner-Reifpilz | Rozites caperatus | 231 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Hörnling; Klebriger | Calocera viscosa | 235 | 2 | * | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Risspilz, Duftender | Inocybe bongardi | 235 | | ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Kegelig | Inocybe rimosa | 235 | 1 | *** | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Risspilz, Birnen- | Inocybe fraudans | 237 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Grünscheiteliger | Inocybe corydalina | 237 | | ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Weinrötlicher | Inocybe adaequate | 237 | 1 | *** | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Risspilz, Ziegelroter | Inocybe erubescens | 237 | | *** | | | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Erdblättriger | Inocybe geophylla | 241 | | ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Flämmling, Geflecktblättriger | Gymnopilus penetrans | 245 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Stummelfüsschen; Blassgelbes- | Crepidotus variabilis | 245 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Stummelfüsschen; Gallertfleischiges | Crepidotus mollis | 245 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Häubchen, Gift- | Galerina marginata | 249 | 1 | *** | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Träuschling, Grünspan- | Stropharia aeruginosa | 251 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Träuschling-, Riesen-, rotbrauner | Stropharia rugosoannulata | 251 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Schwefelkopf, grünblättriger | Hypholoma fasciculare | 253 | 12 | *** | | | | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 2 | | | | |
| Schwefelkopf, rauch- oder graublättr. | Hypholoma capnoides | 253 | 2 | * | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Schwefelkopf, ziegelroter | Hypholoma sublateritium | 253 | 5 | *** | | | | 1 | | | | | 1 | 3 | | | | |
| Schüppling, Pappel- | Pholiota populnea | 255 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Stockschwämmchen | Kuehneromyces mutabilis | 255 | 5 | ** | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | |
| Schüppling, Feuer- | Pholiota flammans | 257 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Schüppling, Hochthronender | Pholiota cerifera | 257 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Schüppling, Pinsel- | Pholiota jahnii | 257 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Schüppling, Sparriger- | Pholiota squarrosa | 257 | 2 | * | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Schüppling, Safranroter | Pholiota astragalina | 259 | 1 | * | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Goldmistpilz, Verschiedenfarbiger | Bolbitius vitellinus | 261 | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Ackerling, Frühlings- | Agrocybe praecox | 263 | 3 | * | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| Ackerling, Halbkugeliger | Agrocybe semiorbicularis | 263 | | * | | | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Bon Bild- Seite | Total 596 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | Lateinische Namen | | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Total Pilzarten | | 272 | | | | | | 32 | 63 | 31 | 89 | 106 | 115 | | |
| Düngerling, Glocken-, Behangener | Panaeolus papilionaceus | 265 | *** | | | | | | | | | | | | |
| Düngerling, Heu- | Panaeolus foenicicii | 265 | *** | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Büscheliger | Psathyrella multipedata | 267 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Faserling, Schmalblättriger | Psathyrella spadiceogrisea | 267 | * | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Wässriger | Psathyrella piluliformis | 268 | * | | | | | | | | | | | | |
| Faserling, Behangener | Psathyrella condolleana | 269 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Saumpilz, Feuerfarbener | Lacrymaria lacrym. var. Pyrotricha | 269 | * | | | | | | | | | 1 | | | |
| Saumpilz, Tränender | Lacrymaria lacrymabunda | 269 | * | | | | | | | | | | | | |
| Tintling, Falten-, Grauer | Coprinus atramentarius | 271 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Tintling-, Schopf | Coprinus comatus | 271 | ** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Tintling, Glimmer- | Coprinus micaceus | 273 | * | | | | | 2 | | | | | | | |
| Champignon, Stadt- | Agaricus bitorquis | 275 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Champignon, Wiesen- | Agaricus campestris | 275 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Champignon, Blut-, Grosssporiger | Agaricus langei | 277 | ** | | | | | | | | | | 1 | | |
| Champignon, Wald-, Kleiner | Agaricus silvaticus | 277 | * | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Champignon, Anis-, Dünnfleischiger | Agaricus silvicola | 279 | ** | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | |
| Champignon, Karbol- | Agaricus xanthoderma Genev. | 279 | *** | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Champignon, Riesen-, Braunschupp. | Agaricus augustus | 279 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Schirmling, Mehl-, Spitzschuppiger | Cystolepiota aspera | 283 | ** | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Schirmling, Zwerg-, Blutblättriger | Melanophyllum haematospermum | 283 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schirmling, Kastanienbrauner | Lepiota castanea | 285 | ** | | | | | | | | | | | | |
| Egerlingsschirmpilz, Rosablättriger | Leucoagaricus leucothites | 289 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schirmpilz, Egerlings-, Blassrosa. | Leucoagaricus sublittoralis | 289 | * | | | | | | | | | | | | |
| Schirmpilz, Egerlings-, Rosablättrig. | Leucoagaricus leucothites | 289 | ** | | | | | | | | | | | | |
| Schirmling, Zitzen- | Macrolepiota gracilentia | 290 | * | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Schirmpilz, Riesen-, Giftiger | Macrolepiota venenata Bon | 291 | *** | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schirmling, Safran- | Macrolepiota rachodes | 291 | ** | | | | | | | | | 1 | | | |
| Streifling, Riesen-, Doppelbescheid. | Amanita ceciliae | 294 | * | | | | | | 2 | | 1 | 2 | | | |
| Schirmling, Schleim-, Getropfter | Limacella guttata | 295 | * | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Grauer | Amanita vaginata | 295 | * | | | | | | | | | 1 | | | |
| Streifling, Scheiden-, Zweifarbiger | Amanita battarrae | 295 | * | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Grauer | Amanita gemmata | 296 | *** | | | | | | | | | | | | |
| Fliegenpilz | Amanita muscaria | 297 | *** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Pantherpilz | Amanita pantherina | 297 | *** | | | | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | | |
| Perlpilz | Amanita rubescens | 297 | * | | | | | | 5 | 2 | 3 | 2 | | | |
| Wulstling, Grauer | Amanita excelsa | 297 | * | | | | | | 4 | 1 | 2 | 2 | | | |
| Wulstling, Igel- (meergrüner) | Amanita eliae | 297 | ** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Wulstling, Narzissgelber | Amanita gemmata | 297 | ** | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Knollenblätterpilz, gelber | Amanita citrina | 299 | *** | | | | | | | | 2 | 3 | 1 | | |
| Knollenblätterpilz, grüner | Amanita phalloides | 299 | *** | | | | | | | | 2 | 4 | | | |
| Knollenblätterpilz, kegelhütiger | Amanita virosa | 299 | *** | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild- Seite | Total 596 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | | 32 | 63 | 31 | 89 | 106 | 115 | | | |
| Wulstling, Fransiger | Amanita strobiliformis | 299 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Wulstling-, Porphyrbrauner | Amanita vaginata | 299 | 2 | ** | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| Morchel, Stink-, Gemeine | Phallus impudicus | 301 | 1 | * | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Tintenfischpilz | Clathrus archeri | 301 | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Erdstern, Gewimperter | Geastrum sessile | 303 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Stäubling, Beutel- | Calviata excipuliformis | 305 | 2 | * | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Stäubling, Birnen- | Lycoperdon pyriforme | 305 | 3 | * | | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Stäubling, Flaschen- | Lycoperdon perlatum | 305 | 1 | * | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Stäubling; Igel- | Lycoperdon echinatum | 305 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Leistling, Grauer | Cantharellus cinereus | 307 | 2 | * | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Leistling, Vollstieliger | Pseudocraterellus sinuosus | 307 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Pfifferling (Eierschwamm) | Cantharellus cibarius | 307 | 4 | *** | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Pfifferling, Starkriechender | Cantharellus lutescens | 307 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Pfifferling, Trompeten- | Cantharellus tubaeformis | 307 | 1 | ** | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Schweinsohr | Gomphus clavatus | 307 | | ** | | | | | | | | | | | | | |
| Totentrompete | Craterellus cornucopioides | 307 | 2 | ** | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Keule, Abgestutzte | Clavariadelphus truncatus | 309 | 3 | * | | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Keule, Herkules- | Clavariadelphus pistillaris | 309 | 4 | * | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| Koralle, Hahnenkamm- | Ramaria botrytis | 309 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Habichtspilz (Rehpilz) | Sarcodon imbricatus | 311 | 3 | * | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| Schichtpilz, Zottiger | Stereum hirsutum | 311 | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Semmelstoppel | Hydnum repandum | 313 | 5 | ** | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | |
| Semmelstoppel, Rotgelber | Hydnum refuscens | 313 | 2 | ** | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Stachelbart, Dorniger | Creolophus cirrhatus | 313 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schuppiger | Polyporus squamosus | 314 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Porling, Stiel-, Schwarzroter | Polyporus badius | 314 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Porling, Winterstiel- | Polyporus brumalis | 314 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Eichhase | Dendropolyporus umbellatus | 315 | 1 | * | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Klapperschwamm, Gemeiner | Grifola frondosa | 315 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Bewimperter | Polyporus ciliatus | 315 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Löwengelber | Polyporus leptocephalus | 315 | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Porling, Sklerotien- | Polyporus tuberaster | 315 | 2 | * | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Porling, Ziegenfuss | Scutigera pes-caprae | 315 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Birken- | Piptoporus betulinus+B360 | 317 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Saft-, Blauender | Postia caesia | 317 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schwefel-, Gemeiner | Polyporus sulphureus | 317 | 2 | * | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Porling, Weich-, Zimtfarbener | Hapalopilus rutilans | 317 | 3 | * | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Tramete, Dreifarbene | Daedaleopsis confragosa var. Tricolor | 318 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Blättling, Birken- | Lenzites betulinus | 319 | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Blättling, Zaun- | Gloeophyllum sepiarium | 319 | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Violett-, Gemeiner | Trichaptum abietinum | 319 | | * | | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild- Seite | Total 596 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Tramete, Buckel- | Trametes gibbosa | 319 | 2 | * | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Tramete, Rötende | Daedaleopsis confragosa | 319 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Tramete, Schmetterlings- | Trametes versicolor | 319 | 3 | * | | | | 1 | | | | | | 2 | | |
| Tramete, Striegelige | Trametes hirsuta | 319 | 2 | * | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Wirrling, Eichen- | Daedalea quercina | 319 | 1 | * | | | | | | 1 | | | | | | |
| Wurzelschwamm, Gemeiner | Heterobasidion annosum | 319 | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Zinnoberschwamm | Pycnoporus cinnabarinus | 319 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Baumschwamm, Rotrandiger | Fomitopsis pinicola | 321 | 1 | * | | | | 1 | | | | | | | | |
| Porling, Lack-, Flacher | Ganoderma lipsiense | 321 | 3 | * | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| Porling, Schiller-, Erlen | Inonotus radiatus | 321 | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Zunderschwamm | Fomes fomentarius | 321 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Fältling, Gallertfleischiger | Merulius tremellosus | 323 | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Judasohr | Auricularia auricula-judea | 324 | 2 | * | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Gallerttrichter, Fleischroter | Tremiscus helvelloides | 325 | 2 | * | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Zitterzahn, Gallertiger | Pseudohydnum gelatinosum | 325 | 2 | * | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| Becherling, Scheiben-, Adriger | Disciotis venosa | 327 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Becher-, Hochgerippte | Paxina acetabulum | 329 | 1 | *** | | | | | 1 | | | | | | | |
| Lorchel, Bischofsmützen- | Gyromitra infula | 329 | 2 | *** | | | | | | | | 2 | | | | |
| Lorchel, Elastische | Leptopodia elastica | 329 | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Lorchel, Gruben- | Helvella lacunosa | 329 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Lorchel, Herbst- | Helvella crispa | 329 | 3 | * | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Becherling, Kelch-, Scharlachroter | Sarcoscypha coccinea | 331 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Becherling, Kronen- | Sarcosphaera coronaria | 331 | 1 | *** | | | | | 1 | | | | | | | |
| Eselsohr | Otidea onotica | 331 | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Becherling, Schmutz- | Bulgaria inquinans | 333 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Gallertköpfchen, Grüngelbes | Leotia lubrica | 333 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Milchpilz, Blut- | Lycogala epidendrum | 335 | 2 | * | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Kugelpilz, Kohliger | Daldinia concentrica | 336 | | * | | | | | | | | | | | | |
| Birkenpilz, Buntfärbender | Leccinum varicolor | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Bovist, Kartoffel-, Dickschaliger | Scleroderma citrinum | -- | 1 | *** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Champignon, Anis- | Agaricus arvensis+B50 | -- | | ** | | | | | | | | | | | | |
| Champignon, Anis-, Schiefknolliger | Agaricus essettei | -- | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Dachpilz, Schwarzscheidiger | Pluteus atomarginatus | -- | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Dachpilz, Verschiedenfarbiger | Pluteus plautus | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Dachpilz, Weisser | Pluteus pellitus | -- | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Datronie, Grossporige | Datronia mollis | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Drüsling, Warziger | Exidia plana | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Feuerschwamm, Rostbrauner | Phellinus ferruginosus | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Feuerschwamm, Rostrandiger | Phellinus ferrugineo-fuscus | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Feuerschwamm, Tannen- | Phellinus hartigii | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Flämmling, Tannen-, Samtschupp. | Gymnopilus sapineus | -- | | * | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild- Seite | Total 596 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | | |
| Hallimasch, Honiggelber | Armillaria mellea | -- | 3 | * | | | | | | | | 2 | | 1 | | | |
| Hallimasch, Keulenfüssiger | Armillaria cepistipes | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Grünschneidiger | Mycena viridimarginata | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Nitrat-, Gelbstieliger | Mycena renati | -- | 2 | * | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Helmling, Nitrat-, Russiger | Mycena capillaripes | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Helmling, Voreilender | Mycena abramsii | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Keule, Holz-, Vielgestaltige | Clavariadelphus polymorpha | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Klumpfuss, Bgrünlings | Cortinarius citrinus | -- | 1 | * | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Knollenblätterpilz, gelber (Var. Weiss) | Amanita citrina var. Alba | -- | 1 | *** | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Knollenblätterpilz, grüner (Var. weiss) | Amanita phalloides fam. Alba Vitt. | -- | 2 | *** | | | | | | | | | 2 | | | | |
| Knollenblätterpilz, weisser | Amanita verna | -- | | *** | | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Leder-, Stinkende | Thelephora palmata | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Koralle, Rosarote | Ramaria subbotrytis | -- | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Lacktrichterling, Rötlicher | Laccaria affinis var. Affinis | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Lohblüte, Gelbe (Hexenbutter) | Fulgio septica | -- | 1 | *** | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Milchling, Rauchfarbener | Lactarius azonites | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Milchling, Violet-, Gezonter | Lactarius violascens | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Pfifferling, Armethytschuppiger | Cantharellus cibarius var. Amethysteus | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Berg- | Bondarzewia montana | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Bienenwaben- | Polyporus mori | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Braun-, Kiefern- | Phaeolus schweinitzii | -- | 2 | * | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| Porling, Mai- | Polyporus ciliatus | -- | 2 | * | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Porling, Riesen-, Gemeiner | Meripilus giganteus | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Russ-, Schwarzweisser | Boletopsis leucomelaena | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schwamm-, Nördlicher | Climacocystis borealis | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Schwarzfuss- | Polyporus badius | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Stiel-, Schwarzfuss | Polyporus melanopus | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Porling, Weich-, Leuchtender | Sowerbyella rhenana | -- | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Rasling, Frost- | Lyophyllum fumosum | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Rasling, Geselliger | Lyophyllum fumosum | -- | 2 | * | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Rasling, Panzer | Lyophyllum loricatum | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Rauhfuß, Eichen- | Leccinum quercinum | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Rauhkopf, Gilbender | Cortinarius rubicundulus | -- | | ** | | | | | | | | | | | | | |
| Risspilz, Frühlings-, Weisstannen- | Inocybe queletii | -- | 2 | ** | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Risspilz, Gefleckter | Inocybe maculata | -- | 1 | ** | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Risspilz, Rübenstieler | Inocybe napipes | -- | | *** | | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Gelbgrüner | Tricholoma sejunctum | -- | 2 | * | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Ritterling, Röt-, Büscheliger | Lepista caespitosa | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Blasshütiger | Boletus depilatus | -- | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Röhrling, Kaukasischer | Boletus caucasicus | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Lärchen-, Grauer | Suillus viscidus | -- | | * | | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild- Seite | Total 596 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Röhrling, Pulver-, Goldporiger | Pulveroboletus gentilis | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Röhrling, Rauhstiel-, Gelbporiger | Leccinum crocipodium | -- | 2 | * | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Röhrling, Satans-, Falscher | Boletus rubrosanguineus | -- | | *** | | | | | | | | | | | | |
| Rotkappe, Eichen- | Leccinum quercinum | -- | 1 | ** | | | | | | | | | 1 | | | |
| Rötling, Filz-, Rhombensporiger | Entoloma rhombisporum | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, Niedergedrückter | Entoloma rhodopolium | -- | 1 | *** | | | | | | | | | 1 | | | |
| Rübling, Breitgebuckelter | Collybia extuberans | -- | 1 | * | | | | 1 | | | | | | | | |
| Rübling, Büschel-, Heller | Collybia oreaidoides | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Rübling, Gefranster | Clitocybula lacerata | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Rübling, Schleim-, Buchen- | Oudemansiella mucida | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Sägeblättling, Harziger | Lentinus adhaerens | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Samthäubchen, Gold- | Conocybe aurea | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Scheidling, Parasitischer | Volvariella surrecta | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schichtpilz, Samtiger | Stereum subtomentosum | -- | 1 | ** | | | | 1 | | | | | | | | |
| Schirmling, Stachel-, Kegelschuppiger | Echinoderma hystrix | -- | 1 | ** | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schirmling, Stink- | Lepiota cristata | -- | 2 | * | | | | | | | | | 2 | | | |
| Schleierling, Dunkelvioletter | Cortinarius violaceus | -- | 3 | * | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Schleimkopf, Stinkender | Cortinarius russeoides | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schleimkopf, Verfärbender | Cortinarius nemorensis | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Grauweisser | Hygrophorus latitabundus | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Schneckling, Rotschuppiger | Hygrophorus queletii | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Wald- | Hygrophorus nemoreus | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Schneckling, Wohlriechender | Hygrophorus agathosmus | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Shiitake, Kultur- | Lentinula edodes | -- | | ** | | | | | | | | | | | | |
| Stacheling, Kork-, Scharfer | Hydnellum peckii | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Grossscheidiger | Amanita magnivolvata | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Streifling, Scheiden-, Silbergrauer | Amanita mairei | -- | 1 | * | | | | | | | | 1 | | | | |
| Täubling, Frauen-, grüner | Russula cyanoxantha f. peltereaui | -- | 4 | ** | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| Täubling, Herings-, Roter | Russula xerampelina | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Lederstiel- | Russula viscida | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Morse- | Russula illota | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Pfirsich-, Violetstieliger | Russula violeipes | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Rosa- | Russula rosea | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Täubling, Spei-, (kirschroter) | Russula emetica | -- | 1 | ** | | | | | 1 | | | | | | | |
| Täubling, Speise-, Ockersporiger | Russula medullata | -- | 1 | * | | | | | 1 | | | | | | | |
| Täubling, Stink-, Gilbender | Russula subfoetens | -- | 1 | * | | | | | | | | | | 1 | | |
| Teuerling, Striegeliger | Cyathus striatus | -- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Tramete, Fenchel- | Gloeophyllum odoratum | -- | 1 | * | | | | 1 | | | | | | | | |
| Porling, Vergänglicher | Oligoporus fragilis | --- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Ritterling, Schwarzscheidiger | Tricholoma hordum | --- | | * | | | | | | | | | | | | |
| Rötling, blasser | Entoloma pallens | --- | | * | | | | | | | | | | | | |

Pilzkalender

2010

Neu im 2010

Sortierung: nach Buch Bon-Parey

| Pilz | Lateinische Namen | Bon Bild- Seite | Total 596 Arten | Speise- wert Giftig- keit | Monat | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
| Anzahl Bestimmungsabende | | | | | | | | | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| Total Pilzarten | | | 272 | | | | | | 32 | 63 | 31 | 89 | 106 | 115 | | | |
| Trichterling, Nabel- | Clitocybe subspadicea | --- | 1 | * | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Wasserfuss, Buchenwald | Hydropus subalpinus | --- | | * | | | | | | | | | | | | | |